

schülke →

Zur Vermeidung einer Verwechslung von octeniderm® farblos mit anderen farblosen Flüssigkeiten empfiehlt schülke folgendes Vorgehen:



octeniderm® farblos



Befüllen Sie eine Schale mit Tupfern.



Füllen Sie octeniderm® farblos nur in ein Gefäß, in dem sich bereits Tupfer befinden.

Andere farblose Flüssigkeit



Stellen Sie eine leere Schale bereit.



Füllen Sie die farblose Flüssigkeit in die leere Schale ein.



octeniderm® farblos – alkoholisches Hautantiseptikum mit Remanenzeffekt.

Konzentration auf das Wesentliche. Hervorragende Wirkung und langer Schutz mit einer Remanenzwirkung von mindestens 48 Stunden bei sehr schnellem Wirkungseintritt.



BAKT. ZID

octeniderm® farblos

Gebrauchsfertiges, alkoholisches, remanentes Hautantiseptikum

Unser Plus

- mindestens 48 Stunden Remanenzwirkung
- insb. zur Anwendung vor invasiven Eingriffen mit einem hohen Infektionsrisiko
- breites antiseptisches Wirkungsspektrum: bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid** (inkl. HBV, HIV, HCV, Herpes-simplex-Viren)
- schneller Wirkungseintritt



Gebindegröße

Gebindegröße	Art.-Nr.
Karton mit 10 x 250 ml-Flasche	118211
Karton mit 10 x 1 l-Flasche	118212

Zubehör

Sprühkopf für 500 ml / 1 l-Flasche	180212
Wandhalterung 1 l-Vierkantflasche	134416

** gemäß DVV-/RKI-Leitlinie 12/2014

octeniderm® farblos: Wirkstoffe: Octenidindihydrochlorid, 1-Propanol (Ph.Eur.), 2-Propanol (Ph.Eur.). **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: 0,1 g Octenidindihydrochlorid, 30,0 g 1-Propanol (Ph.Eur.), 45,0 g 2-Propanol (Ph.Eur.). Sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierung von Blutgefäßen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien sowie zur Nahtversorgung. Falls kein spezielles Händedesinfektionsmittel zur Verfügung steht, kann octeniderm® farblos auch zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion verwendet werden. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen wie Rötungen, Brennen und Juckreiz kommen. Auch allergische Reaktionen (z.B. Kontaktekzem) sind möglich. Stand 09/20

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH · 22840 Norderstedt · Tel: +49 40 52100-666 · info@schuelke.com

schülke -+

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt | Deutschland
Telefon | Telefax +49 40 52100-0 | -318
www.schuelke.com

youtube.com/schuelkeChannel
 facebook.com/myschulke

901128 | III | 01.2021 | B | westwerk
Produktinformation wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.

IP: 01.07.20